Pino Ortega, José

Dr. Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Facultad Ciencias Deporte. Universidad Murcia.

Móvil: +34 620938535

Correo: josepinoortega@um.es

Grupo investigación: E0A1-06 BIOVETMED & SPORTSCI

Navarro Martínez, Carlos

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Facultad Ciencias Deporte. Universidad Murcia.

Móvil: +34 685118928

Correo: c.navarromartinez@um.es

**Cardiotoxicidad
en mujeres con cáncer de mama**

An anatomical illustration of the human heart, showing the four chambers (right and left atria and ventricles) and the major blood vessels. The coronary arteries, which supply the heart muscle with oxygenated blood, are highlighted in a light blue color. The heart is shown in a slightly elevated perspective, with the aorta and pulmonary artery visible at the top. The overall color palette is soft and realistic, with various shades of red, pink, and blue.

¿Existe una relación entre la quimioterapia y el corazón?

La **cardiotoxicidad**, se refiere a efectos perjudiciales en el corazón, causada por tratamientos farmacológicos o terapias, concretamente centrándonos en las mujeres con cáncer de mama que reciben quimioterapia puede convertirse en un problema significativo,

Pino, J.; Navarro, C.

que puede manifestarse en diversas alteraciones cardiacas, incluyendo cambios en la frecuencia cardiaca y la función del miocardio.

Pino, J.; Navarro, C.

Santacruz Maridueña, M. P. (2020). Cardiotoxicidad en una Cohorte de pacientes con Diagnóstico de Cáncer de Mama que Recibieron Quimioterapia con Antraciclinas. Seguimiento a 12 años. *Oncología (Guayaquil)*, 149-158.

Algunos medicamentos, usadas comúnmente en el tratamiento del cáncer de mama, están asociadas con un riesgo significativo de cardiotoxicidad, que puede incluir arritmias, cambios en la frecuencia cardíaca y miocardiopatía.

Pino, J.; Navarro, C.

Tipos de cardiotoxicidad (2)

Tipo I (irreversible)

Relacionada con las **antraciclinas**, provoca daño estructural en los cardiomiocitos. Las antraciclinas son una clase de agentes quimioterapéuticos ampliamente utilizados en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama.

Tipo I (irreversible)

Las antraciclinas son sustancias son antibióticos antitumorales que actúan inhibiendo la síntesis de ADN y ARN en las células cancerosas, impidiendo su replicación y crecimiento.

Pino, J.; Navarro, C.

REVERSIBLE CARDIOTOXESITY

Tipo II (reversible)

Asociada a agentes como **trastuzumab**, que no causa daño estructural directo y puede revertirse con la interrupción del tratamiento.

Pino, J.; Navarro, C.

Tipo II (reversible)

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal utilizado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de mama y gástrico. Es especialmente relevante para los pacientes cuyos tumores sobreexpresan la proteína HER2, que se encuentra en aproximadamente el **15-20% de los casos de cáncer de mama.**

Pino, J.; Navarro, C.

TABLA COMPARATIVA CARDIOITOXICIDAD TIPO I Y II		
Características	Tipo I (Irreversible)	Tipo II (Reversible)
Agentes Asociados	Antraciclinas (ej., doxorubicina, epirubicina)	Trastuzumab (y otros inhibidores HER2)
Mecanismo de Daño	Daño estructural directo a los cardiomiocitos	Sin daño estructural directo; alteración funcional
Efecto en el Corazón	Miocardiopatía irreversible, insuficiencia cardíaca	Disfunción miocárdica temporal, reversible tras suspensión
Probabilidad de Reversibilidad	Baja (daño permanente a las células cardíacas)	Alta (reversibilidad posible con la interrupción del agente)
Recomendaciones de Monitoreo	Monitoreo continuo, especialmente en dosis acumulativas; evaluaciones periódicas de la función cardíaca (ej., ecocardiograma)	Monitoreo frecuente al iniciar el tratamiento y seguimiento continuo de la función cardíaca
Medidas de Prevención	Uso de cardioprotectores (ej., dexrazoxano), limitar dosis total acumulativa	Ajuste de dosis según respuesta cardíaca, suspender si es necesario
Ejemplos de Evaluación	Resonancia magnética cardíaca, ecocardiograma, medición de biomarcadores cardíacos (troponina, BNP)	Ecocardiograma, medición de fracción de eyección al inicio y durante el tratamiento
Aplicación Clínica	Común en tratamientos de cáncer de mama, sarcomas, linfomas	Frecuente en cánceres de mama HER2 positivo

Impacto clínico de las alteraciones en la frecuencia cardiaca

Predictor de riesgo cardiovascular:

La frecuencia cardíaca anormal, ya sea elevada o disminuida, puede ser un marcador temprano de disfunción cardíaca.

Pino, J.; Navarro, C.

En pacientes oncológicos, cambios en la frecuencia cardíaca pueden indicar daño inducido por fármacos como las antraciclinas o

trastuzumab, antes de que se manifiesten síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca.

Pino, J.; Navarro, C.

PREVENTIVE & MITIGATIVE THERAPY FOR CARDIOTOXICITY

PREVENTIVE & MITIGATIVE THERAPY FOR CARDIOTOXICITY

Terapia preventiva y de mitigación:

La detección de alteraciones en la frecuencia cardíaca permite implementar medidas preventivas y de manejo, como ajustes en la dosis de quimioterapia,

Pino, J.; Navarro, C.

PREVENTIVE THERAPY FOR CARDIOTOXICITY

PREVENTIVE & MITIGATIVE THERAPY FOR CARDIOTOXICITY

el uso de agentes cardioprotectores (ej., dexrazoxano) o la recomendación de intervenciones no farmacológicas como el ejercicio físico supervisado

Pino, J.; Navarro, C.

The background consists of several overlapping, semi-transparent cards from a fitness tracking application. Each card displays various metrics: a large percentage (e.g., 70%, 57%, 71%, 74%, 90%, 87%, 84%, 89%), a heart rate in BPM (e.g., 111, 89, 114, 121, 175, 164, 155, 172), a distance in kcal/m (e.g., 8, 8, 8, 8, 17, 16, 14, 17), and a time in MM:SS:SS (e.g., 00:29:46, 00:26:26, 00:19:40, 00:11:26). There are also smaller numbers at the top of some cards (e.g., 48270, 50959, 20000, 59068, 8167, 58031) and small bar charts at the bottom of some cards. The cards are in various colors like green, orange, and red.

Importancia de la monitorización de la frecuencia cardiaca

Importancia del monitoreo continuo: La vigilancia periódica de la frecuencia cardíaca mediante tecnologías de monitoreo portátil o evaluaciones hospitalarias puede ser crucial para intervenir de manera temprana y prevenir complicaciones mayores, incluyendo insuficiencia cardíaca crónica.

Pino, J.; Navarro, C.

Impacto en la calidad de vida y supervivencia:

Alteraciones persistentes en la frecuencia cardíaca pueden afectar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente.

Pino, J.; Navarro, C.

Además, se ha demostrado que una frecuencia cardíaca elevada de forma sostenida se asocia con un menor tiempo de supervivencia en pacientes con antecedentes de tratamientos cardiotoxicos.

FC

Tiempo

Pino, J.; Navarro, C.

Beneficios de un ejercicio físico supervisado:

Mejora la capacidad cardiorrespiratoria y ayuda a reducir la fatiga.

Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual está asociado con un menor riesgo de eventos cardíacos.

Puede contrarrestar algunos efectos secundarios de la quimioterapia, como la pérdida de masa muscular.

Evitar la cardiotoxicidad en el tratamiento del
cáncer de mama .

Los hallazgos científicos subrayan la importancia de la monitorización cardiovascular regular en pacientes bajo tratamientos quimioterápicos, para identificar y manejar tempranamente la cardiotoxicidad, lo que podría incluir ajustes en el tratamiento oncológico o la introducción de terapias

Pino, J.; Navarro, C.

BODYTONE

EVOT4

WIMU Fit

Opciones

wimuFit ENTRENAMIENTO LIBRE

20000 109 BPM 69 kcal 00:12:32	50959 105 BPM 65 kcal 00:10:27		
62763 130 BPM 77 kcal 00:13:48	48270 101 BPM 61 kcal 00:13:48	24514 105 BPM 65 kcal 00:11:37	3419 93 BPM 58 kcal 00:13:46
8167 168 BPM 88 kcal 00:13:45	249 kcal		

mostrar / ocultar Información Extra

ACTIVITY Default

WIMU Fit Session

00:00:00

START STOP

Usuarios Sesiones Programadas Laps

SHOWN (7)	DETECTED (0)
Arrastre una columna aquí para agrupar por columnas.	
Alias	ID
	20000
	50959
	62763

Referencias bibliográficas

Cardinale, D., Iacopo, F., & Cipolla, C. M. (2020). Cardiotoxicity of anthracyclines. *Frontiers in cardiovascular medicine*, 7, 26.

Chen, J., Long, J. B., Hurria, A., Owusu, C., Steingart, R. M., & Gross, C. P. (2012). Incidence of heart failure or cardiomyopathy after adjuvant trastuzumab therapy for breast cancer. *Journal of the American College of Cardiology*, 60(24), 2504-2512.

Sengupta, P. P., Northfelt, D. W., Gentile, F., Zamorano, J. L., & Khandheria, B. K. (2008, February). Trastuzumab-induced cardiotoxicity: heart failure at the crossroads. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 83, No. 2, pp. 197-203). Elsevier.

Caro-Moran, E., Fernandez-Lao, C., Galiano-Castillo, N., Cantarero-Villanueva, I., Arroyo-Morales, M., & Diaz-Rodriguez, L. (2016). Heart rate variability in breast cancer survivors after the first year of treatments: a case-controlled study. *Biological research for nursing*, 18(1), 43-49.

Monsuez, J. J., Charniot, J. C., Vignat, N., & Artigou, J. Y. (2010). Cardiac side-effects of cancer chemotherapy. *International journal of cardiology*, 144(1), 3-15.

Cardiotoxicidad
Cáncer de mama